

MEDICAMENTO	CONDICIÓN DE VENTA	DOSIS Y FRECUENCIA DE CONSUMO	COMO TOMARLO /APLICARLO	INTERRACIONES CON OTROS ALIMENTOS/MEDICAMENTOS	EFFECTOS ESPERADOS/EVENTOS ADVERSOS
MED 4D CREM X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	La utilización simultánea con peróxidos	Eritema, sensibilidad cutánea aumentada y hiperpigmentación de la piel.
MED BELLANEW 1.5 MG 2 MG X 28 TAB	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Medicamentos inductores de las enzimas microsomiales, medicamentos inhibidor de proteasa o inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa y	Cefaleas, Migraña, Ánimo depresivo, Aumento/disminución de la libido, Nuseas, trastornos menstruales, Hemorragia intermenstrual, Dolor mamario, Mastalgia, Secreción vaginal, Candidiasis vulvovaginal
MED BETAZOL CREM X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Interacciones Clobetasol: No se han descrito.	Sensación de quemazón de la piel; foliculitis; escozor en el lugar de aplicación , reacción inespecífica en el lugar de aplicación.
MED BETAZOL LOCION X60ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Interacciones Clobetasol: No se han descrito.	Sensación de quemazón de la piel; foliculitis; escozor en el lugar de aplicación , reacción inespecífica en el lugar de aplicación.
MED BETAZOL UNGÜENTO X 30 GR	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Interacciones Clobetasol: No se han descrito.	Sensación de quemazón de la piel; foliculitis; escozor en el lugar de aplicación , reacción inespecífica en el lugar de aplicación.
MED BONAC GEL X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Efecto irritante con: agentes descamantes, exfoliantes o abrasivos.	Eritema, prurito, sequedad de piel, piel escamosa, irritación de ojos y/o sensación de ardor.
MED CLINACYN GEL X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Hipersensibilidad a adapaleno, a clindamicina. -Debidas a adapaleno: Aumenta el riesgo de irritación intensa, enrojecimiento y molestia local por efecto aditivo con: alcohol, mentol, sustancias potencialmente irritantes (como lociones astringentes, exfoliantes, cremas de afeitar, jabones medicados o abrasivos, cosméticos con acción secante, ceras depilatorias, perfumes y similares). -Debidas a clindamicina: puede absorberse sistémicamente, puede prolongar el efecto bloqueante neuromuscular de agentes como tubocurarina, succinilcolina, pancuronio y vecuronio.	Sequedad de la piel, descamación, molestia local, eritema, sensación punzante y ardorosa, prurito, quemadura solar; irritación, ardor, eritema, resequedad, prurito, descamación, piel grasa.
MED CLOBELAC EMULS 0.05% X60ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Interacciones Clobetasol: No se han descrito.	Sensación de quemazón de la piel; foliculitis; escozor en el lugar de aplicación , reacción inespecífica en el lugar de aplicación.
MED DAPTOMIX 5% GEL TUBO X20G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	El uso de peróxido de benzoilo y de dapsona en la misma zona con acné vulgaris, puede ocasionar temporalmente una coloración amarilla-naranja de la piel y presencia de vello facial. No se recomienda el uso simultáneo. Concentraciones plasmáticas aumentadas con: trimetoprim/sulfametoxazol. Riesgo aumentado de desarrollar metahemoglobinemia con: sulfonamidas, paracetamol, benzocaína, cloroquina, naftaleno, nitratos y nitritos, nitrofurantoina, nitroglicerina, nitroprusiato, fenacetina, fenobarbital, fenitoina, primaquina y quinina.	Eritema, sequedad, grasitud/descamación de la piel en el sitio de la aplicación.
MED DERMOSUPRIL CREM 0.05% X15G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	No deben usarse en áreas extensas o en gran cantidad en pacientes embarazadas o mujeres que estén planeando un embarazo. Durante la lactancia, no debe ser aplicado en el pecho antes de amamantar	Ardor, prurito o enrojecimiento cuando se aplica por primera vez sobre la piel, atrofia cutánea; un mayor uso producirá insuf.
MED DERMOSUPRIL CREM 0.1% X15G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	No deben usarse en áreas extensas o en gran cantidad en pacientes embarazadas o mujeres que estén planeando un embarazo. Durante la lactancia, no debe ser aplicado en el pecho antes de amamantar	Ardor, prurito o enrojecimiento cuando se aplica por primera vez sobre la piel, atrofia cutánea; un mayor uso producirá insuf.
MED DERMOSUPRIL EMULS X120ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	No deben usarse en áreas extensas o en gran cantidad en pacientes embarazadas o mujeres que estén planeando un embarazo. Durante la lactancia, no debe ser aplicado en el pecho antes de amamantar	Ardor, prurito o enrojecimiento cuando se aplica por primera vez sobre la piel, atrofia cutánea; un mayor uso producirá insuf.

ED DIFENZ CREMA DESPIGMENTADOR 30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	. Hidroquinona: Puede producir coloración temporal de piel con: peróxidos (agua oxigenada, peróxido de benzoilo, etc.).	.Mometasona: Sensación de quemazón leve ó moderada en el punto de aplicación, hormigueo/picor, prurito, infecciones bacterianas, parestesia, forunculosis y atrofia cutánea local. .Hidroquinona: Eritema, escozor y sensibilización cutánea. En tto. muy prolongado, hiperpigmentación cutánea. . ácido retinoico: Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula; hipervitaminosis A.
MED DM HALOCORT CREMA 0.05% 30GR	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	No existe información disponible de interacciones medicamentosas con propionato de halobetasol tópico. Esta preparación deberá ser empleada con precaución en pacientes que estén tomando tratamiento antimicótico sistémico o tratamiento con esteroides.	Picazón, quemadura o comezón
MED DOXICLAT X20TAB	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Riesgo de hipopotasemia con: otros diuréticos ahorradores de potasio o suplementos de potasio, IECA o de antagonistas de los receptores de la angiotensina II, AINES, trimetoprima/sulfametoxazol. Acción diurética disminuida con: dosis altas de AAS, antiinflamatorios no esteroideos como indometacina y ácido mefenámico pueden atenuar la eficacia en la diuresis natriurética debido a la inhibición de la síntesis intrarenal de prostaglandinas. Espironolactona se une al receptor androgénico y puede aumentar los niveles de antígeno prostático específico en pacientes con cáncer de próstata tratados con abiraterona. Por ello, no se recomienda el uso concomitante de espironolactona con abiraterona.	Malestar, fatiga; ginecomastia, menstruación irregular, amenorrea, sangrado post menopáusico, impotencia; diarrea, náuseas; dolor de cabeza, somnolencia.
MED ETIDOXINA X 10 CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Reduce efecto de: anticonceptivos orales. Potencia acción de: anticoagulantes orales (reducir dosis), antidiabéticos orales del tipo de la sulfonilurea (monitorizar y ajustar dosis), isotretinoína (riesgo de hipertensión intracraneal aumentada), evitar. Nefrotoxicidad aumentada con: diuréticos, metoxiflurano. Incompatible con: sol. Ringer-lactato, antibióticos bactericidas.	Reacción anafiláctica (incluyendo angioedema, exacerbación del lupus eritematoso sistémico, pericarditis, hipersensibilidad, enf. del suero; púrpura Schönlein-Henoch, hipotensión, disnea, taquicardia, edema periférico y urticaria); cefalea; náuseas, vómitos; reacción de fotosensibilidad, erupción incluyendo erupción eritematosa y maculopapular.
MED FINAPEL 1MG X28TAB	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Debido a la ausencia de datos sobre el uso concomitante de finasterida y minoxidil tópico en varones con patrón de pérdida de pelo no se recomienda el uso de esta combinación.	.Reacciones de hipersensibilidad, incluyendo erupción cutánea, picor, urticaria e hinchazón de labios y cara. .Disminución de la libido .Depresión, ansiedad .Disfunción eréctil, alteraciones de la eyaculación (incluyendo disminución del volumen de eyaculación).
MED FITOSTIMOLINE CREM X32G VL	Venta Libre	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	No existen reportes de la interacción con medicamentos u otras sustancias.	El producto es bien tolerado y no se han reportado efectos colaterales hasta la fecha.
MED FITOSTIMOLINE CREMA 15 GR VL	Venta Libre	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	No existen reportes de la interacción con medicamentos u otras sustancias.	El producto es bien tolerado y no se han reportado efectos colaterales hasta la fecha.
MED GLICOLIC H LOCION X60ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	La utilización simultánea de la hidroquinona con peróxidos (por ejemplo: agua oxigenada, peróxido de benzoilo, etc) puede producir una coloración temporal de la piel, debido a la oxidación de la hidroquinona. Esta coloración temporal se elimina interrumpiendo el uso de uno de estos medicamentos y lavando la zona de aplicación con un jabón suave.	Eritema. Raras: sensibilidad cutánea aumentada y hiperpigmentación de la piel. Escozor en el lugar de aplicación.

MED HICLINA 100MG X10TAB	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Reduce efecto de: anticonceptivos orales. Potencia acción de: anticoagulantes orales (reducir dosis), antidiabéticos orales del tipo de la sulfonilurea (monitorizar y ajustar dosis), isotretinoína (riesgo de hipertensión intracraneal aumentada), evitar. Nefrotoxicidad aumentada con: diuréticos, metoxiflurano. Incompatible con: sol. Ringer-lactato, antibióticos bactericidas.	Reacción anafiláctica (incluyendo angioedema, exacerbación del lupus eritematoso sistémico, pericarditis, hipersensibilidad, enf. del suero; púrpura Schönlein-Henoch, hipotensión, disnea, taquicardia, edema periférico y urticaria); cefalea; náuseas, vómitos; reacción de fotosensibilidad, erupción incluyendo erupción eritematosa y maculopapular.
MED HISTOTAL 25000UI COLECALCITEROLX4UN	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Efecto reducido con: glucocorticoides. Riesgo de toxicidad digitálica (arritmia) con: digitálicos (vigilar concentración sérica de Ca y monitorizar ECG). Absorción disminuida por: colestiramina, aceites minerales, corticosteroides, hidrocloreuro de colestipol, orlistat. Metabolización acelerada por: antiepilépticos, barbitúricos. Riesgo de hipercalcemia con: preparados con Ca (dosis elevadas). Inhibición a nivel renal por: actinomicina, antifúngicos imidazólicos.	Administración excesiva y durante periodos largos: hipercalcemia, anorexia, cefalea, vómitos y diarrea. Lactantes: molestias gastrointestinales, fragilidad ósea, retraso en crecimiento.
MED ISOFACE 10MG X30CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Riesgo de hipervitaminosis A con: vitamina A. Riesgo de hipertensión intracraneal con: tetraciclinas (asociación contraindicada). Aumento de la irritación local con: queratolíticos tópicos o agentes exfoliantes antiacné.	Anemia, aumento velocidad de sedimentación, trombocitopenia, trombocitosis, neutropenia; cefalea; blefaritis, conjuntivitis, sequedad ocular, irritación ocular; epistaxis, sequedad nasal, nasofaringitis; aumento de transaminasas; querilitis, dermatitis, sequedad de piel, descamación localizada, prurito, exantema eritematoso, fragilidad de piel (riesgo de lesión por rascado); artralgias, mialgias, lumbalgia (sobre todo, entre los adolescentes); aumento triglicéridos en sangre, disminución lipoproteínas de alta densidad, aumento del colesterol y glucemia en sangre, hematuria, proteinuria; disfunción sexual incluyendo disfunción eréctil y disminución de la libido. Otras reacciones adversas identificadas después de la evaluación de los datos de farmacovigilancia: ginecomastia; sequedad vaginal; uretritis.
MED ISOFACE 20MG X40CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Riesgo de hipervitaminosis A con: vitamina A. Riesgo de hipertensión intracraneal con: tetraciclinas (asociación contraindicada). Aumento de la irritación local con: queratolíticos tópicos o agentes exfoliantes antiacné.	Anemia, aumento velocidad de sedimentación, trombocitopenia, trombocitosis, neutropenia; cefalea; blefaritis, conjuntivitis, sequedad ocular, irritación ocular; epistaxis, sequedad nasal, nasofaringitis; aumento de transaminasas; querilitis, dermatitis, sequedad de piel, descamación localizada, prurito, exantema eritematoso, fragilidad de piel (riesgo de lesión por rascado); artralgias, mialgias, lumbalgia (sobre todo, entre los adolescentes); aumento triglicéridos en sangre, disminución lipoproteínas de alta densidad, aumento del colesterol y glucemia en sangre, hematuria, proteinuria; disfunción sexual incluyendo disfunción eréctil y disminución de la libido. Otras reacciones adversas identificadas después de la evaluación de los datos de farmacovigilancia: ginecomastia; sequedad vaginal; uretritis.
MED KETOMED CHAMP X100ML VL	Venta Libre	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	No se han realizado estudios de interacciones.	Sensación de quemazón, eritema, picor.

MED KINOR NF SLN X10ML VL	Venta Libre	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Salicílico ácido, tópico: No se han descrito.	Salicílico ácido, tópico: Pueden llegar a presentarse ligeras manifestaciones de irritación local.
MED LEAXIN 0.1% CREM X15G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Mometasona tópica: No se han realizado estudios de interacciones.	Sensación de quemazón leve ó moderada en el punto de aplicación, hormigueo/picor, prurito, infecciones bacterianas, parestesia, forunculosis y atrofia cutánea local.
MED LEXINEX CHAMP X120ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	No se recomienda su uso simultáneo con sustancias con potencial fototóxico o fotoactivador (ej.: tetraciclinas, psoralenos como metoxaleno o trioxaleno, tretinoina). Se pueden producir efectos fotosensibilizantes aditivos. Se podrían potenciar los efectos de otros productos queratolíticos aplicados en la misma zona.	Brea hulla + salicílico ácido: Ocasionalmente eritema, sequedad, dermatitis de contacto, folliculitis, irritación cutánea, erupción acneiforme, sensación ardor o quemazón.
MED LYMECIN 150MG X16CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	No se debe utilizar en conjunto con retinoides orales, por riesgo de hipertensión endocraneal; la administración simultánea con preparaciones con hierro y antiácidos, como geles con hidróxido de aluminio, pueden derivar en una reacción de la administración de la limeciclina, pero pueden administrarse con intervalo de 2 h entre uno y otro medicamento; no se modifica la absorción de limeciclina por la ingesta de alimento o leche.	Náuseas, pirois, epigastralgia, diarrea, enterocolitis y glositis; reacciones de hipersensibilidad como urticaria, rash, prurito o edema de Quinke y reacciones de fotosensibilidad; trastornos hematológicos como en otras tetraciclinas: anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia, eosinofilia; hipernatremia extrarrenal unida o ligada al efecto antibiótico que pueda intensificarse por la asociación con diuréticos.
MED LYMECIN 300MG X16CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	No se debe utilizar en conjunto con retinoides orales, por riesgo de hipertensión endocraneal; la administración simultánea con preparaciones con hierro y antiácidos, como geles con hidróxido de aluminio, pueden derivar en una reacción de la administración de la limeciclina, pero pueden administrarse con intervalo de 2 h entre uno y otro medicamento; no se modifica la absorción de limeciclina por la ingesta de alimento o leche.	Náuseas, pirois, epigastralgia, diarrea, enterocolitis y glositis; reacciones de hipersensibilidad como urticaria, rash, prurito o edema de Quinke y reacciones de fotosensibilidad; trastornos hematológicos como en otras tetraciclinas: anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia, eosinofilia; hipernatremia extrarrenal unida o ligada al efecto antibiótico que pueda intensificarse por la asociación con diuréticos.
MED MINOT 100MG X10TAB	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Minociclina: Absorción disminuida por: antiácidos con Fe, Al, Ca, Mg. Aumenta acción de: anticoagulantes; disminuir dosis. No administrar con: antibióticos bactericidas.	Minociclina Coloración permanente en dientes e inhibición de desarrollo óseo en niños; anorexia, náusea, vómito, diarrea, urticaria, erupción, dermatitis, sobreinfección, anemia hemolítica, trombocitopenia, eosinofilia.
MED NIOGERMOX X 3.3 ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Ciclopirox: No se dispone de datos sobre interacciones medicamentosas. Sin embargo, dado el bajo nivel de absorción sistémica, es poco probable que se produzcan interacciones medicamentosas.	Ciclopirox Fenómenos de sensibilización; irritación de la piel, prurito, eritema, erucción, sensación de ardor en la piel.
MED NUTRACORT LOCION X120ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Hidrocortisona tópica: Aunque no se han descrito interacciones con otras sustancias no aplicar simultáneamente en la misma zona que otras preparaciones tópicas.	Hidrocortisona tópica: Dermatitis de contacto/dermatitis; escozor, retraso en la cicatrización, ardor, hematomas, telangiectasia, erupciones acneiformes, aumento de la sudoración, rosácea, dermatitis perioral, edema, hiperglucemia/glucosuria, osteoporosis.

MED ORACEA 40MG X28CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Doxiciclin: Reduce efecto de: anticonceptivos orales. Potencia acción de: anticoagulantes orales (reducir dosis), antidiabéticos orales del tipo de la sulfonilurea (monitorizar y ajustar dosis), isotretinoína (riesgo de hipertensión intracraneal aumentada), evitar. Interfiere con acción bactericida de: penicilina, evitar. Metabolismo activado por: rifampicina, barbitúricos, carbamazepina, difenilhidantoína, primidona, fenitoína y alcohol. Nefrotoxicidad aumentada con: diuréticos, metoxiflurano. Aumenta concentración plasmática de: litio, digoxina y teofilina.	Reacción anafiláctica (incluyendo angioedema, exacerbación del lupus eritematoso sistémico, pericarditis, hipersensibilidad, enf. del suero; púrpura Schönlein-Henoch, hipotensión, disnea, taquicardia, edema periférico y urticaria); cefalea; náuseas, vómitos; reacción de fotosensibilidad, erupción incluyendo erupción eritematosa y maculopapular. Formas de liberación modificada: nasofaringitis, sinusitis, infección fúngica; ansiedad; cefalea sinusoidal; hipertensión; diarrea, dolor abdominal superior, boca seca; dolor de espalda; dolor en el lugar de iny.; ASAT, presión sanguínea, LDH en sangre y glucosa en sangre elevadas. Además: la reacción Jarisch-Herxheimer.
MED PARUL 45CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	En caso de presentar alguno alguna reacción adversa consulte a su médico tratante.
MED PRESIDERM UNGUENTO2% X15G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Mupirocina: Evitar con otras preparaciones de uso cutáneo.	Mupirocina: Quemazón localizada en el área de aplicación.
MED PRIMAX LACA 8% X3ML VL	Venta Libre	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Ciclopírox: No se dispone de datos sobre interacciones medicamentosas. Sin embargo, dado el bajo nivel de absorción sistémica, es poco probable que se produzcan interacciones medicamentosas.	Ciclopírox Fenómenos de sensibilización; irritación de la piel, prurito, eritema, erucción, sensación de ardor en la piel.
MED PROCICAR REGENERIX CREMA X 32G VL	Venta Libre	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	En caso de presentar alguno alguna reacción adversa consulte a su médico tratante.
MED PROFITECH X55CAP VL	Venta Libre	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	En caso de presentar alguno alguna reacción adversa consulte a su médico tratante.
MED ROVACOR 20 MG X 30 CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Riesgo de hipervitaminosis A con: vitamina A. Riesgo de hipertensión intracraneal con: tetraciclinas (asociación contraindicada). Aumento de la irritación local con: queratolíticos tópicos o agentes exfoliantes antiacné.	Anemia, aumento velocidad de sedimentación, trombocitopenia, trombocitosis, neutropenia; cefalea; blefaritis, conjuntivitis, sequedad ocular, irritación ocular; epistaxis, sequedad nasal, nasofaringitis; aumento de transaminasas; queratitis, dermatitis, sequedad de piel, descamación localizada, prurito, exantema eritematoso, fragilidad de piel (riesgo de lesión por rascado); artralgias, mialgias, lumbalgia (sobre todo, entre los adolescentes); aumento triglicéridos en sangre, disminución lipoproteínas de alta densidad, aumento del colesterol y glucemia en sangre, hematuria, proteinuria; disfunción sexual incluyendo disfunción eréctil y disminución de la libido. Otras reacciones adversas identificadas después de la evaluación de los datos de farmacovigilancia: ginecomastia; sequedad vaginal; uretritis.
MED ROZELAIC GEL X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Azelaico ácido No se han realizado estudios de interacción.	Azelaico ácido Eritema, prurito, escozor, irritación, descamación, sequedad, despigmentación en la zona de aplicación.
MED ROZEX GEL 0.75% X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Metronidazol tópico Efecto antabús con: disulfiram, alcohol. Puede potenciar efecto anticoagulante de: cumarina, warfarina.	Metronidazol tópico Piel seca, eritema, prurito, malestar en la piel (quemazón, dolor/escozor), irritación de piel, empeoramiento de la rosácea, lagrimeo.

MED SINAC GEL X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Clindamicina + peróxido de benzoilo El uso concomitante con antibióticos cutáneos, jabones y limpiadores medicinales o abrasivos, jabones y cosméticos que tengan un fuerte efecto secante, y productos con altas concentraciones de alcohol y/o astringentes se debe realizar con precaución, ya que se puede producir un efecto irritante acumulativo. Evitar la aplicación simultánea con preparaciones cutáneas que contengan eritromicina, debido al posible antagonismo con clindamicina. Precaución en el tratamiento concomitante con agentes bloqueantes neuromusculares, clindamicina ha demostrado tener propiedades bloqueantes a nivel neuromuscular que pueden aumentar la acción de otros agentes bloqueantes neuromusculares. Evitar la aplicación concomitante con tretinoína, isotretinoína y tazaroteno, ya que el peróxido de benzoilo puede disminuir su eficacia y aumentar la irritación. Si es necesario un tratamiento de combinación, los productos se deben aplicar en momentos diferentes del día (por ejemplo, uno por la mañana y otro por la noche). El uso cutáneo de preparaciones que contienen peróxido de benzoilo en combinación con productos cutáneos que contengan sulfonamidas puede causar cambios temporales en el color de la piel y pelo facial (amarillo/naranja).	Clindamicina + peróxido de benzoilo Dolor de cabeza; prurito, sensación de ardor, sequedad, eritema, descamación, dermatitis, reacciones de fotosensibilidad; dolor en el lugar de la aplicación.
MED SKINPRED TUBO X15G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	No registra información	Prednicarbato: Prurito, escozor, rubefacción exudación, pústulas, foliculitis, ardor.
MED TRETINEX 10MG X30CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Riesgo de hipervitaminosis A con: vitamina A. Riesgo de hipertensión intracraneal con: tetraciclinas (asociación contraindicada). Aumento de la irritación local con: queratolíticos tópicos o agentes exfoliantes antiacné.	Anemia, aumento velocidad de sedimentación, trombocitopenia, trombocitosis, neutropenia; cefalea; blefaritis, conjuntivitis, sequedad ocular, irritación ocular; epistaxis, sequedad nasal, nasofaringitis; aumento de transaminasas; queilitis, dermatitis, sequedad de piel, descamación localizada, prurito, exantema eritematoso, fragilidad de piel (riesgo de lesión por rascado); artralgias, mialgias, lumbalgia (sobre todo, entre los adolescentes); aumento triglicéridos en sangre, disminución lipoproteínas de alta densidad, aumento del colesterol y glucemia en sangre, hematuria, proteinuria; disfunción sexual incluyendo disfunción eréctil y disminución de la libido. Otras reacciones adversas identificadas después de la evaluación de los datos de farmacovigilancia: ginecomastia; sequedad vaginal; uretritis.

MED TRETINEX 20MG X30CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Riesgo de hipervitaminosis A con: vitamina A. Riesgo de hipertensión intracraneal con: tetraciclinas (asociación contraindicada). Aumento de la irritación local con: queratolíticos tópicos o agentes exfoliantes antiacné.	Anemia, aumento velocidad de sedimentación, trombocitopenia, trombocitosis, neutropenia; cefalea; blefaritis, conjuntivitis, sequedad ocular, irritación ocular; epistaxis, sequedad nasal, nasofaringitis; aumento de transaminasas; queilitis, dermatitis, sequedad de piel, descamación localizada, prurito, exantema eritematoso, fragilidad de piel (riesgo de lesión por rascado); artralgias, mialgias, lumbalgia (sobre todo, entre los adolescentes); aumento triglicéridos en sangre, disminución lipoproteínas de alta densidad, aumento del colesterol y glucemia en sangre, hematuria, proteinuria; disfunción sexual incluyendo disfunción eréctil y disminución de la libido. Otras reacciones adversas identificadas después de la evaluación de los datos de farmacovigilancia: ginecomastia; sequedad vaginal; uretritis.
MED UREADERM 15% X60G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	No se registran reportes	Carbamida: Podría producirse irritación o picazón
MED ALDOQUIN 4% CREMA X 15 GR	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Hidroquinona: Puede producir coloración temporal de piel con: peróxidos (agua oxigenada, peróxido de benzoilo, etc.).	Hidroquinona Eritema, escozor y sensibilización cutánea. En tto. muy prolongado, hiperpigmentación cutánea.
MED ALQUIN GEL X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Tretinoína tópica Precaución con tto. tópico concomitante, especialmente: jabones medicinales o abrasivos, cosméticos deshidratantes, productos con alcohol, astringentes, azufre, resorcinol o ác. salicílicoAumento fototoxicidad con: tiazidas, tetraciclinas, fluoroquinolonas, fenotiazinas, sulfonamidas.	Tretinoína tópica Sequedad o descamación cutánea, quemaduras, picor, ardor, eritema local grave, edema, ampollas, escaras, prurito e hipo e hiperpigmentación pasajera.
MED ANEMIDOX X30CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Hierro fumarato + ascórbico ácido + fólico ácido + cianocobalamina: .Debidas al ác. ascórbico: Aumenta biodisponibilidad de: estrógenos. Oxidación incrementada por: corticosteroides. Excreción renal incrementada por: AAS, barbitúricos, tetraciclinas. Niveles reducidos por: alcohol. Disminuye efecto de: fenotiazinas. Reduce concentración de: flufenazina. .Debidas a ác. fólico: Necesidades aumentadas por: metotrexato, trimetoprima, estrógenos, sulfamidas, corticosteroides (uso prolongado), alcohol, suplementos de Zn, antiácidos, colestiramina, colestipol, triamtereno, antimaláricos, sulfasalazina, carbamazepina, ác. valproico, pirimetamina, aminopterina, antituberculosos. Disminuye efecto de: fenobarbital, fenitoína, primidona. . Debidas a o vit. B12 : Respuesta terapéutica disminuida por: cloranfenicol y otros depresores de la médula ósea. Concentración sérica disminuida por: anticonceptivos orales. Se inactiva por: óxido nítrico. Nivel sérico disminuido por: zidovudina. Nivel sérico de ác. fólico y vit. B12 reducido por: metformina.	Hierro fumarato + ascórbico ácido + fólico ácido + cianocobalamina: Malestar epigástrico, sensación de plenitud, náuseas o vómitos, constipación, diarrea; sensibilización alérgica a la administración de ácido fólico.

MED APEPLUS FINASTERIDE 1MG X30TAB	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Debido a la ausencia de datos sobre el uso concomitante de finasterida y minoxidil tópico en varones con patrón de pérdida de pelo no se recomienda el uso de esta combinación.	.Reacciones de hipersensibilidad, incluyendo erupción cutánea, picor, urticaria e hinchazón de labios y cara. .Disminución de la libido .Depresión, ansiedad .Disfunción eréctil, alteraciones de la eyaculación (incluyendo disminución del volumen de eyaculación).
MED BELLAFACE SUAVE X28TAB	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Dienogest y etinilestradiol Efectividad anticonceptiva reducida por: carbamazepina, acetato de eslicarbazepina, felbamato, oxcarbazepina, fenitoína, primidona, rufinamida, topiramato, (Fos)aprepitant, barbitúricos, bosentán, griseofluvina, nelfinavir, ritonavir, ritonavir-potenciador de los inhibidores de la proteasa, modafinilo, nevirapamina, rifampicina, rifabutina, penicilinas, tetraciclinas, Hierba de San Juan. Concentraciones plasmáticas aumentadas de etinilestradiol por: zumo de pomelo, ácido ascórbico, itraconazol, ketoconazol, voriconazol, fluconazol, etoricoxib, atazanavir, indinavir, atorvastatina, rosuvastatina, etravirina, paracetamol. Aumenta concentraciones plasmáticas de: ciclosporina, omeprazol, prednisolona, selegilina, teofilina, tizanidina, voriconazol, Disminuye concentraciones plasmáticas de: lamotrigina, paracetamol, ácido clofibrico, morfina, temazepam, Reduce el efecto de: anticoagulantes orales, sin embargo, potencian la acción del acenocumarol.	Dienogest y etinilestradiol Cefalea; dolor mamario.
MED BELLAFACE TAB X21TAB	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Dienogest y etinilestradiol Efectividad anticonceptiva reducida por: carbamazepina, acetato de eslicarbazepina, felbamato, oxcarbazepina, fenitoína, primidona, rufinamida, topiramato, (Fos)aprepitant, barbitúricos, bosentán, griseofluvina, nelfinavir, ritonavir, ritonavir-potenciador de los inhibidores de la proteasa, modafinilo, nevirapamina, rifampicina, rifabutina, penicilinas, tetraciclinas, Hierba de San Juan. Concentraciones plasmáticas aumentadas de etinilestradiol por: zumo de pomelo, ácido ascórbico, itraconazol, ketoconazol, voriconazol, fluconazol, etoricoxib, atazanavir, indinavir, atorvastatina, rosuvastatina, etravirina, paracetamol. Aumenta concentraciones plasmáticas de: ciclosporina, omeprazol, prednisolona, selegilina, teofilina, tizanidina, voriconazol, Disminuye concentraciones plasmáticas de: lamotrigina, paracetamol, ácido clofibrico, morfina, temazepam, Reduce el efecto de: anticoagulantes orales, sin embargo, potencian la acción del acenocumarol.	Dienogest y etinilestradiol Cefalea; dolor mamario.
MED BEMERIN LOCION 0.1% FRASCO X 60 ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Mometasona + salicílico ácido: No se han realizado estudios de interacciones.	Mometasona + salicílico ácido Sensación de ardor en el sitio de aplicación; prurito, atrofia cutánea local.
MED BENZAC AC 5%GEL X60G VL VL	Venta Libre	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Peróxido de benzoilo No debe utilizarse simultáneamente con: sustancias con efectos descamativos, irritantes o secantes, como jabones y limpiadores abrasivos o desecantes, productos cosméticos con alcohol, exfoliantes como tretinoína, resorcinol, ácido salicílico, azufre ya que pueden producirse efectos acumulativos.	Peróxido de benzoilo Irritación de la piel con sensación de calor, picor o dolor; dermatitis de contacto.

MED BENZAC AC WASH GEL X100GR VL	Venta Libre	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Peróxido de benzoilo No debe utilizarse simultáneamente con: sustancias con efectos descamativos, irritantes o secantes, como jabones y limpiadores abrasivos o desecantes, productos cosméticos con alcohol, exfoliantes como tretinoína, resorcinol, ácido salicílico, azufre ya que pueden producirse efectos acumulativos.	Peróxido de benzoilo Irritación de la piel con sensación de calor, picor o dolor; dermatitis de contacto.
MED BETARRETIN H CREM X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Hidroquinona: Puede producir coloración temporal de piel con: peróxidos (agua oxigenada, peróxido de benzoilo, etc.).	Hidroquinona: Eritema, escozor y sensibilización cutánea. En tto. muy prolongado, hiperpigmentación cutánea.
MED BETARRETIN H LOCION X60ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Hidroquinona: Puede producir coloración temporal de piel con: peróxidos (agua oxigenada, peróxido de benzoilo, etc.).	Hidroquinona: Eritema, escozor y sensibilización cutánea. En tto. muy prolongado, hiperpigmentación cutánea.
MED BETARRETIN LOCION X60ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Tretinoína tópica: Precaución con tto. tópico concomitante, especialmente: jabones medicinales o abrasivos, cosméticos deshidratantes, productos con alcohol, astringentes, azufre, resorcinol o ác. salicílico. Espaciar con queratolíticos o exfoliantes. Aumento fototoxicidad con: tiazidas, tetraciclinas, fluoroquinolonas, fenotiazinas, sulfonamidas.	Tretinoína tópica: Sequedad o descamación cutánea, quemaduras, picor, ardor, eritema local grave, edema, ampollas, escaras, prurito e hipo e hiperpigmentación pasajera.
MED CLOB-X CHAMP X125ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Clobetasol No se han descrito.	Clobetasol: Sensación de quemazón de la piel; foliculitis; escozor en el lugar de aplicación , reacción inespecífica en el lugar de aplicación,
MED CONTRACTUBEX GEL X20G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Alantoína + allium cepa + heparina: No se han realizado estudios de interacciones. Ninguna conocida hasta la fecha.	Alantoína + allium cepa + heparina: Prurito, eritema, telangiectasias, atrofia de la cicatriz.
MED CROMUS 0.03%UNG X15G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Tacrolímús tópico: Precaución con: administración sistémica concomitante de inhibidores del CYP3A4 (p. ej. eritromicina, itraconazol, ketoconazol y diltiazem).	Tacrolímús tópico: Quemazón, prurito, calor, eritema, dolor, irritación, parestesia y exantema en zona de aplic.; infecciones virales por herpes; foliculitis, prurito, rosácea; parestesias y disestesias; intolerancia al alcohol; linfomas y cáncer de piel.
MED CROMUS 0.1% UNG X15G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Tacrolímús tópico: Precaución con: administración sistémica concomitante de inhibidores del CYP3A4 (p. ej. eritromicina, itraconazol, ketoconazol y diltiazem).	Tacrolímús tópico: Quemazón, prurito, calor, eritema, dolor, irritación, parestesia y exantema en zona de aplic.; infecciones virales por herpes; foliculitis, prurito, rosácea; parestesias y disestesias; intolerancia al alcohol; linfomas y cáncer de piel.
MED DERMACORTINE CREM X15G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Mometasona tópica No se han realizado estudios de interacciones.	Mometasona tópica: Sensación de quemazón leve ó moderada en el punto de aplicación, hormigueo/picor, prurito, infecciones bacterianas, parestesia, forunculosis y atrofia cutánea local.
MED DERMACORTINE EMULS X60ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Mometasona tópica No se han realizado estudios de interacciones.	Mometasona tópica: Sensación de quemazón leve ó moderada en el punto de aplicación, hormigueo/picor, prurito, infecciones bacterianas, parestesia, forunculosis y atrofia cutánea local.
MED DERMACORTINE LOCION X30ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Mometasona tópica No se han realizado estudios de interacciones.	Mometasona tópica: Sensación de quemazón leve ó moderada en el punto de aplicación, hormigueo/picor, prurito, infecciones bacterianas, parestesia, forunculosis y atrofia cutánea local.

MED DESONIDA CREM 0.1% X15G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Anticonceptivos hormonales: puede reducir la eficacia de las píldoras anticonceptivas.	Desonida tópica Ardor, prurito o enrojecimiento cuando se aplica por primera vez sobre la piel, atrofia cutánea; un mayor uso producirá insuf. de la corteza adrenal con una respuesta inadecuada del eje hipotálamo-hipofisario a situaciones de estrés como una infección o cirugía; edema por retención de sodio, hiperglicemia, glicosuria, HTA, síndrome de Cushing con todo su cortejo sintomático, hipocaliemia, inducción de úlcera péptica, retardo en la curación de heridas, atrofia muscular por catabolismo proteico, hiperlipemias por movilización de la reserva de lípidos, osteoporosis y en los niños puede producir retraso en el crecimiento.
MED DESONIDA EMULS 0.05% X120ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Anticonceptivos hormonales: puede reducir la eficacia de las píldoras anticonceptivas.	Desonida tópica Ardor, prurito o enrojecimiento cuando se aplica por primera vez sobre la piel, atrofia cutánea; un mayor uso producirá insuf. de la corteza adrenal con una respuesta inadecuada del eje hipotálamo-hipofisario a situaciones de estrés como una infección o cirugía; edema por retención de sodio, hiperglicemia, glicosuria, HTA, síndrome de Cushing con todo su cortejo sintomático, hipocaliemia, inducción de úlcera péptica, retardo en la curación de heridas, atrofia muscular por catabolismo proteico, hiperlipemias por movilización de la reserva de lípidos, osteoporosis y en los niños puede producir retraso en el crecimiento.
MED DIFFERIN 0.1% GEL TUBO X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Adapaleno: Evitar: con otros retinoides o medicamentos de acción similar, exposición a luz solar excesiva o radiación UV.	Adapaleno Irritación cutánea, sensación de quemazón, sequedad de piel, eritema. Se han identificado reacción anafiláctica, angioedema, quemadura en el lugar de aplicación, hipopigmentación de la piel e hiperpigmentación de la piel como nuevas reacciones adversas asociadas a adapaleno. La mayoría de los casos de quemaduras en el lugar de aplicación fueron quemaduras superficiales, aunque se han notificado casos con quemaduras de segundo grado o quemaduras graves.
MED DIFFERIN 0.3% GEL X 45 GR	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Adapaleno: Evitar: con otros retinoides o medicamentos de acción similar, exposición a luz solar excesiva o radiación UV.	Adapaleno Irritación cutánea, sensación de quemazón, sequedad de piel, eritema. Se han identificado reacción anafiláctica, angioedema, quemadura en el lugar de aplicación, hipopigmentación de la piel e hiperpigmentación de la piel como nuevas reacciones adversas asociadas a adapaleno. La mayoría de los casos de quemaduras en el lugar de aplicación fueron quemaduras superficiales, aunque se han notificado casos con quemaduras de segundo grado o quemaduras graves.
MED EDAPIL M ESPUMA X100G	Venta Libre	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Minoxidil tópico: Incrementa el riesgo de hipotensión ortostática en concomitancia con: guanetidina y derivados. Absorción aumentada en concomitancia con: otros productos tópicos como corticoides, retinoides o pomadas oclusivas.	Minoxidil tópico Prurito, dermatitis, sequedad, irritación cutánea, eccema, hipertrichosis, descamación, eritema; reacciones alérgicas que incluyen angioedema.

MED ENITRAX X14CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Biodisponibilidad aumentada por: ritonavir, indinavir, claritromicina, eritromicina. Controlar concentración plasmática, acción y efecto 2 ario y reducir dosis, si es necesario, de: anticoagulantes orales, IP, alcaloides de la vinca, busulfano, docetaxel, trimetrexato, dihidropiridinas, verapamilo, cerivastatina, ciclosporina, tacrolimús, rapamicina, digoxina, carbamazepina, buspirona, fentanilo, alfentanilo, alprazolam, brotizolam, midazolam IV, rifabutina, dexametasona, budesónida, metilprednisolona, fluticasona, ebastina, reboksetina, loperamida, disopiramida, cilostazol, halofantrina, repaglinida. Absorción disminuida por: fármacos que reducen acidez (espaciar 2 h de itraconazol convencional).	Itraconazol Dolor abdominal, náuseas; exantema. Además IV: hipopotasemia; dolor de cabeza, mareos; disnea; vómitos, diarrea, estreñimiento; hepatitis, ictericia, hiperbilirrubinemia, incremento de enzimas hepáticas; prurito; edema, pirexia.
MED ENITRAX X30CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Biodisponibilidad aumentada por: ritonavir, indinavir, claritromicina, eritromicina. Controlar concentración plasmática, acción y efecto 2 ario y reducir dosis, si es necesario, de: anticoagulantes orales, IP, alcaloides de la vinca, busulfano, docetaxel, trimetrexato, dihidropiridinas, verapamilo, cerivastatina, ciclosporina, tacrolimús, rapamicina, digoxina, carbamazepina, buspirona, fentanilo, alfentanilo, alprazolam, brotizolam, midazolam IV, rifabutina, dexametasona, budesónida, metilprednisolona, fluticasona, ebastina, reboksetina, loperamida, disopiramida, cilostazol, halofantrina, repaglinida. Absorción disminuida por: fármacos que reducen acidez (espaciar 2 h de itraconazol convencional).	Itraconazol Dolor abdominal, náuseas; exantema. Además IV: hipopotasemia; dolor de cabeza, mareos; disnea; vómitos, diarrea, estreñimiento; hepatitis, ictericia, hiperbilirrubinemia, incremento de enzimas hepáticas; prurito; edema, pirexia.
MED EPIDUO 0.3 FORTE X30ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Adapaleno + peróxido de benzoilo: No utilizar de forma conjunta con otros retinoides, peróxido de benzoilo o sustancias con un modo de acción similar. Precaución si se utilizan cosméticos con efectos descamativos, irritantes o reseccantes, pueden producir efectos irritativos aditivos.	Adapaleno + peróxido de benzoilo: Sequedad cutánea, dermatitis de contacto irritativa, irritación cutánea, quemazón, eritema y exfoliación de la piel (descamación), quemadura en el lugar de aplicación.
MED EPIDUO GEL X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Adapaleno + peróxido de benzoilo: No utilizar de forma conjunta con otros retinoides, peróxido de benzoilo o sustancias con un modo de acción similar. Precaución si se utilizan cosméticos con efectos descamativos, irritantes o reseccantes, pueden producir efectos irritativos aditivos.	Adapaleno + peróxido de benzoilo: Sequedad cutánea, dermatitis de contacto irritativa, irritación cutánea, quemazón, eritema y exfoliación de la piel (descamación), quemadura en el lugar de aplicación.
MED ESQUERAT GEL X 3 G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Puesto que la absorción sistémica del diclofenaco a partir de una formulación tópica es muy baja, es muy poco probable que se produzcan este tipo de interacciones.	Diclofenaco antiinflamatorio tópico: Irritación local ligera o moderada, enrojecimiento, erupción cutánea, picor. Los apósitos adhesivos medicamentosos además eritema y sensación de quemazón.
MED FOLISTER COMPLEX X60ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Minoxidil tópico Incrementa el riesgo de hipotensión ortostática en concomitancia con: guanetidina y derivados. Absorción aumentada en concomitancia con: otros productos tópicos como corticoides, retinoides o pomadas oclusivas.	Minoxidil tópico Prurito, dermatitis, sequedad, irritación cutánea, eccema, hipertricosis, descamación, eritema; reacciones alérgicas que incluyen angioedema.
MED FOLISTER HAIR LOTION X60ML	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Aunque no está clínicamente probado, existe la posibilidad teórica de que el minoxidil absorbido pueda potenciar la hipotensión ortostática en pacientes que toman vasodilatadores periféricos concomitantemente.	Prurito, hipertricosis, exantema, exantema acneiforme, dermatitis, trastorno cutáneo inflamatorio. Edema periférico.

MED FOLISTER TAB 1MGX28TAB	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Debido a la ausencia de datos sobre el uso concomitante de finasterida y minoxidil tópico en varones con patrón de pérdida de pelo no se recomienda el uso de esta combinación.	.Reacciones de hipersensibilidad, incluyendo erupción cutánea, picor, urticaria e hinchazón de labios y cara. .Disminución de la libido .Depresión, ansiedad .Disfunción eréctil, alteraciones de la eyaculación (incluyendo disminución del volumen de eyaculación).
MED HELIOCARE ORAL X60CAP VL	Venta Libre	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Betacaroteno: No hay datos sobre interacciones.	Betacaroteno: Dosificación aguda: Hipervitaminosis A, cefaleas (principalmente en la región occipital), fatigas, mareos, náuseas, vómitos, y signos de presión encefálica acrecentada. Dosificación crónica: astenia, apatía, hiperexcitabilidad, cefaleas, disomnias, anorexia, náuseas, vómitos.
MED LIDOMAX CREM X15G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Lidocaína anestésico local Vía sistémica: Efectos cardíacos tóxicos aditivos con: antiarrítmicos Efecto depresor del SNC aditivo con: depresores del SNC, antiepilépticos, barbitúricos, benzodiazepinas; ajustar dosis. Potencia efecto de: bloqueantes neuromusculares. Aumenta riesgo de hipotensión con: IMAO. Aumenta efectos vagales de: fentanilo, alfentanilo. Riesgo de irritación y edema con: desinfectantes con metales pesados. Precipita con: metohexital sódico, fenitoína sódica, cefazolina sódica, dacarbazina, amfotericina B. Evitar mezclar con: fármacos estables a pH ácido	Lidocaína anestésico local Vía sistémica: hipotensión, bradicardia y posible paro cardíaco; espasmos generales, pérdida de conocimiento. En raquianestesia: dolor de espalda, cefalea, incontinencia fecal y/o urinaria, parestesia, parálisis de las extremidades inferiores y problemas respiratorios. Vía tópica (apósito): reacción en lugar de administración (quemazón, dermatitis, eritema, prurito, erupción, irritación cutánea, vesículas)
MED LIDOMAX CREM X5G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Lidocaína anestésico local Vía sistémica: Efectos cardíacos tóxicos aditivos con: antiarrítmicos Efecto depresor del SNC aditivo con: depresores del SNC, antiepilépticos, barbitúricos, benzodiazepinas; ajustar dosis. Potencia efecto de: bloqueantes neuromusculares. Aumenta riesgo de hipotensión con: IMAO. Aumenta efectos vagales de: fentanilo, alfentanilo. Riesgo de irritación y edema con: desinfectantes con metales pesados. Precipita con: metohexital sódico, fenitoína sódica, cefazolina sódica, dacarbazina, amfotericina B. Evitar mezclar con: fármacos estables a pH ácido	Lidocaína anestésico local Vía sistémica: hipotensión, bradicardia y posible paro cardíaco; espasmos generales, pérdida de conocimiento. En raquianestesia: dolor de espalda, cefalea, incontinencia fecal y/o urinaria, parestesia, parálisis de las extremidades inferiores y problemas respiratorios. Vía tópica (apósito): reacción en lugar de administración (quemazón, dermatitis, eritema, prurito, erupción, irritación cutánea, vesículas)
MED LOCERYL LACA X2.5ML VL	Venta Libre	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Amorolfina: No se han realizado estudios de interacción.	Amorolfina Raras: dermatitis de contacto, eritema, prurito, sensación de quemazón o escozor. Alteración, decoloración de la uña y onicoclasia (sol. uñas).
MED MINOFOAM FRASCO X 100G VL	Venta Libre	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Minoxidil tópico Incrementa el riesgo de hipotensión ortostática en concomitancia con: guanetidina y derivados. Absorción aumentada en concomitancia con: otros productos tópicos como corticoides, retinoides o pomadas oclusivas.	Minoxidil tópico Prurito, dermatitis, sequedad, irritación cutánea, eccema, hipertrichosis, descamación, eritema; reacciones alérgicas que incluyen angioedema.
MED OVALE SHAMPOO X250ML VL	Venta Libre	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Leer siempre la etiqueta del medicamento en especial el Venta Libre.	Ketoconazol tópico: No se han realizado estudios de interacciones.	Ketoconazol tópico: Sensación de quemazón, eritema, picor.

MED RETACNYL 0.025% CREMA X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Tretinoína tópica Precaución con tto. tópico concomitante, especialmente: jabones medicinales o abrasivos, cosméticos deshidratantes, productos con alcohol, astringentes, azufre, resorcinol o ác. salicílico. Espaciar con queratolíticos o exfoliantes. Aumento fototoxicidad con: tiazidas, tetraciclinas, fluoroquinolonas, fenotiazinas, sulfonamidas.	Tretinoína tópica Sequedad o descamación cutánea, quemaduras, picor, ardor, eritema local grave, edema, ampollas, escaras, prurito e hipo e hiperpigmentación pasajera.
MED RETACNYL 0.05% X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Tretinoína tópica Precaución con tto. tópico concomitante, especialmente: jabones medicinales o abrasivos, cosméticos deshidratantes, productos con alcohol, astringentes, azufre, resorcinol o ác. salicílico. Espaciar con queratolíticos o exfoliantes. Aumento fototoxicidad con: tiazidas, tetraciclinas, fluoroquinolonas, fenotiazinas, sulfonamidas.	Tretinoína tópica Sequedad o descamación cutánea, quemaduras, picor, ardor, eritema local grave, edema, ampollas, escaras, prurito e hipo e hiperpigmentación pasajera.
MED SOOLANTRA CREM 1% X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Ivermectina tópica: Exposición plasmática aumentada con: inhibidores potentes del CYP3A4.	Ivermectina tópica: Sensación ardor en la piel, irritación de la piel, prurito y sequedad de la piel; hinchazón de la cara.
MED TAZAT 0.05% GEL X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Tazaroteno Evitar con: medicamentos y cosméticos que causen irritación o tengan efecto deshidratante.	Tazaroteno Prurito, ardor, eritema, irritación, descamación, erupciones no específicas, dermatitis de contacto irritante, dolor, empeoramiento de psoriasis.
MED TAZAT 0.1% GEL X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Tazaroteno Evitar con: medicamentos y cosméticos que causen irritación o tengan efecto deshidratante.	Tazaroteno Prurito, ardor, eritema, irritación, descamación, erupciones no específicas, dermatitis de contacto irritante, dolor, empeoramiento de psoriasis.
MED TETRALYSAL 150MG X16CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	No se debe utilizar en conjunto con retinoides orales, por riesgo de hipertensión endocraneal; la administración simultánea con preparaciones con hierro y antiácidos, como geles con hidróxido de aluminio, pueden derivar en una reacción de la administración de la linciclina, pero pueden administrarse con intervalo de 2 h entre uno y otro medicamento; no se modifica la absorción de linciclina por la ingesta de alimento o leche.	Náuseas, pirosis, epigastralgia, diarrea, enterocolitis y glositis; reacciones de hipersensibilidad como urticaria, rash, prurito o edema de Quincke y reacciones de fotosensibilidad; trastornos hematológicos como en otras tetraciclinas: anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia, eosinofilia; hipernatremia extrarrenal unida o ligada al efecto antibiótico que pueda intensificarse por la asociación con diuréticos.
MED TETRALYSAL 300 MG X 28 CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	No se debe utilizar en conjunto con retinoides orales, por riesgo de hipertensión endocraneal; la administración simultánea con preparaciones con hierro y antiácidos, como geles con hidróxido de aluminio, pueden derivar en una reacción de la administración de la linciclina, pero pueden administrarse con intervalo de 2 h entre uno y otro medicamento; no se modifica la absorción de linciclina por la ingesta de alimento o leche.	Náuseas, pirosis, epigastralgia, diarrea, enterocolitis y glositis; reacciones de hipersensibilidad como urticaria, rash, prurito o edema de Quincke y reacciones de fotosensibilidad; trastornos hematológicos como en otras tetraciclinas: anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia, eosinofilia; hipernatremia extrarrenal unida o ligada al efecto antibiótico que pueda intensificarse por la asociación con diuréticos.
MED TETRALYSAL 300MG X16CAP	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	No se debe utilizar en conjunto con retinoides orales, por riesgo de hipertensión endocraneal; la administración simultánea con preparaciones con hierro y antiácidos, como geles con hidróxido de aluminio, pueden derivar en una reacción de la administración de la linciclina, pero pueden administrarse con intervalo de 2 h entre uno y otro medicamento; no se modifica la absorción de linciclina por la ingesta de alimento o leche.	Náuseas, pirosis, epigastralgia, diarrea, enterocolitis y glositis; reacciones de hipersensibilidad como urticaria, rash, prurito o edema de Quincke y reacciones de fotosensibilidad; trastornos hematológicos como en otras tetraciclinas: anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia, eosinofilia; hipernatremia extrarrenal unida o ligada al efecto antibiótico que pueda intensificarse por la asociación con diuréticos.

D TRANEXAM (ACIDO TRANEXAMICO) X50G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Hematurias masivas de vías urinarias superiores por riesgo de obstrucción uretral; I.R. por riesgo de acumulación; no administrar vía IM; uso concomitante con anticonceptivos orales (aumenta el riesgo de trombosis); inyec. IV hacerse muy lentamente.	Tranexámico ácido: Náuseas, vómitos, diarreas; malestar con hipotensión, con o sin pérdida de la conciencia (tras inyec. IV rápida, de forma excepcional después de una administración oral), Trombosis venosa o arterial en cualquier localización; convulsiones; reacciones de hipersensibilidad incluyendo anafilaxis.
MED ZUDENINA F GEL X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Adapaleno: Evitar: con otros retinoides o medicamentos de acción similar, exposición a luz solar excesiva o radiación UV.	Adapaleno Irritación cutánea, sensación de quemazón, sequedad de piel, eritema. Se han identificado reacción anafiláctica, angioedema, quemadura en el lugar de aplicación, hipopigmentación de la piel e hiperpigmentación de la piel como nuevas reacciones adversas asociadas a adapaleno. La mayoría de los casos de quemaduras en el lugar de aplicación fueron quemaduras superficiales, aunque se han notificado casos con quemaduras de segundo grado o quemaduras graves.
MED ZUDENINA GEL X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Adapaleno: Evitar: con otros retinoides o medicamentos de acción similar, exposición a luz solar excesiva o radiación UV.	Adapaleno Irritación cutánea, sensación de quemazón, sequedad de piel, eritema. Se han identificado reacción anafiláctica, angioedema, quemadura en el lugar de aplicación, hipopigmentación de la piel e hiperpigmentación de la piel como nuevas reacciones adversas asociadas a adapaleno. La mayoría de los casos de quemaduras en el lugar de aplicación fueron quemaduras superficiales, aunque se han notificado casos con quemaduras de segundo grado o quemaduras graves.
MED ZUDENINA PB FORTE GEL X 30 G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Adapaleno + peróxido de benzoilo: No utilizar de forma conjunta con otros retinoides, peróxido de benzoilo o sustancias con un modo de acción similar. Precaución si se utilizan cosméticos con efectos descamativos, irritantes o reseccantes, pueden producir efectos irritativos aditivos.	Adapaleno + peróxido de benzoilo: Sequedad cutánea, dermatitis de contacto irritativa, irritación cutánea, quemazón, eritema y exfoliación de la piel (descamación), quemadura en el lugar de aplicación.
MED ZUDENINA PB GEL X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Adapaleno + peróxido de benzoilo: No utilizar de forma conjunta con otros retinoides, peróxido de benzoilo o sustancias con un modo de acción similar. Precaución si se utilizan cosméticos con efectos descamativos, irritantes o reseccantes, pueden producir efectos irritativos aditivos.	Adapaleno + peróxido de benzoilo: Sequedad cutánea, dermatitis de contacto irritativa, irritación cutánea, quemazón, eritema y exfoliación de la piel (descamación), quemadura en el lugar de aplicación.
MED ZUDENINA PLUS GEL X30G	Venta bajo fórmula médica	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	De acuerdo con indicación de su medico (Ver fórmula medica)	Adapaleno + clindamicina: - Debidas a adapaleno: Aumenta el riesgo de irritación intensa, enrojecimiento y molestia local por efecto aditivo con: alcohol, mentol, sustancias potencialmente irritantes (como lociones astringentes, exfoliantes, cremas de afeitar, jabones medicados o abrasivos, cosméticos con acción secante, ceras depilatorias, perfumes y similares). - Debidas a clindamicina: Debido a que la clindamicina tópica puede absorberse sistémicamente, puede prolongar el efecto bloqueante neuromuscular de agentes como tubocurarina, succinilcolina, pancuronio y vecuronio.	Adapaleno + clindamicina: Sequedad de la piel, descamación, molestia local, eritema, sensación punzante y ardorosa, prurito, quemadura solar; irritación, ardor, eritema, resequedad, prurito, descamación, piel grasa.